

Merkblatt

Internistische
Gemeinschaftspraxis



Dr. med. Jörg Mangold
Dr. med. Wolfgang Böck
Gastroenterologe, Diabetologe DDG

Söflinger Straße 168
89077 Ulm
Telefon 0731/37174
Telefax 0731/36810
Mail: praxis@internisten-ulm.de
www.internisten-ulm.de
Die Praxis ist zertifiziert nach
DIN EN ISO 9001:2000 ZertNr.: 1820717

Informationsblatt für die Durchführung einer
Helicobacter-Behandlung
(medikamentöse Entfernung des Magenkeims
Helicobacter pylori = Eradikationstherapie)

Hochdosis-Amoxicillin-Therapie

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient !

Bei Ihnen wurde (im Rahmen einer Magenspiegelung) der Magenkeim Helicobacter pylori festgestellt. Da dieser für die Entstehung von Magengeschwüren und auch bösartigen Magengeschwülsten häufig mit verantwortlich ist, soll eine Behandlung mit Tabletten durchgeführt werden. Ziel dieser Behandlung ist es, den Keim abzutöten und somit einen dauerhaften Heilungserfolg zu erreichen.

Wir bitten Sie daher, die nachfolgend genannten Medikamente in der beschriebenen Weise einzunehmen. Nur die konsequente Einnahme der Medikamente über **14 Tage** kann diesen Heilungserfolg gewährleisten.

Da eine vorausgegangene Behandlung zu keinem Erfolg geführt hat, muss eine Behandlung mit anderen Medikamenten durchgeführt werden. Die genaue und konsequente Einnahme ist wichtig!

Sollten Sie Fragen haben oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an uns oder Ihren Hausarzt. Vielen Dank!

Ihr Praxisteam der Praxis Dres. Mangold / Böck


Dr. Mangold


Dr. Böck

Medikament	Einnahme	morgens	mittags	abends
Omeprazol 40 mg z.B. Nexium 40®, Antra 40®, Omep 40, Omeprazol 40	vor dem Essen	1	1	1
Amoxicillin 1000 mg	vor dem Essen	1	1	1

Die Tabletten müssen **über 14 Tage** eingenommen werden! Bei Problemen oder Nebenwirkungen (z.B. Hautausschlag) sprechen Sie bitte mit Ihrem Hausarzt oder uns!

Zur Sicherung des Behandlungserfolges können Sie folgendes beitragen:

- konsequente Einnahme der Medikamente
- Während der Behandlungswoche nicht zu rauchen
- möglichst kein Alkohol oder Schmerzmittel einnehmen
- Unterstützung mit best. Probiotika kann die Verträglichkeit und die Wirkung der Behandlung verbessern, z.B. Lacteol® 1-0-1